

Comment nous contacter ?

Radiologie - Scanner - Echographie

Mammographie :

☎ 071/265 240

☎ 071/265 248

Résonance magnétique :

☎ 071/265 372

Médecine nucléaire :

☎ 071/265 315

APP CHR Sambre et Meuse, site Sambre
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre

Rue Chère-Voie, 75

5060 SAMBREVILLE

☎ 071/ 265 211

www.chrvs.be



L'infiltration

De quoi s'agit-il ?

L'infiltration consiste à **injecter un anti-inflammatoire** à base de **cortisone** à l'endroit responsable de votre douleur. Elle permettra de **soulager** temporairement votre douleur. Le geste médical est réalisé sous contrôle scanner (écran).

Contre-indications :

- la grossesse ou le risque de grossesse
- l'allaitement
- l'allergie à la cortisone

la prise d'anticoagulants n'est pas une contre-indication absolue



Précautions :

- une injection de cortisone peut révéler un diabète latent ou déséquilibrer un diabète existant
- s'il s'agit d'une infiltration péri-durale ou péri-radriculaire, il vous sera demandé d'arrêter la prise d'anticoagulants avant l'examen :

10 jours avant l'examen pour le Plavix et le Ticlid.

7 jours avant l'examen pour le Sintrom.

il faudra les remplacer par du Clexane, mais ne pas prendre de Clexane la veille de l'examen

Conseil après l'infiltration :

Repos minimum 4 heures après l'infiltration, pour une meilleure efficacité de celle-ci. L'amélioration se manifeste dans la semaine qui suit l'infiltration.



Comment se déroule l'examen ?

Pendant l'infiltration, suivez bien les recommandations du médecin et du technologue. Votre coopération est essentielle, elle contribuera à la rapidité du geste de ponction et diminuera les risques de douleur et de complication.

Vous serez allongé sur le ventre ou sur le dos selon le type d'infiltration. Un scanner de repérage sera réalisé, c'est sur base de celui-ci que le médecin déterminera le point de ponction.

Après désinfection cutanée, le médecin réalisera l'injection sous contrôle scanner.

Quand l'infiltration est terminée, le technologue désinfectera le point de ponction et posera un pansement.

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de complications.

Complications précoces :

- malaise vagal
- flush facial (rougeur, bouffée de chaleur) dû à la cortisone
- douleurs au point de ponction pendant quelques heures

Complications tardives :

Rares :

- infection du point de ponction : fièvre, chaleur, rougeur, gonflement
- si infiltration péri-durale ou péri-radriculaire, risques de symptômes neurologiques tels que la radiculalgie (irritation racine nerveuse) ou la sciatalgie (irritation du nerf sciatique).

Exceptionnelles :

- hématome épidural
- paresthésie et paralysie